



Slimību profilakses un
kontroles centrs

1. DECEMBRIS - PASAULES AIDS DIENA

Mīti par HIV un AIDS



MĪTS:

Ar HIV slimo tikai narkotiku lietotāji, homoseksuāli cilvēki, seksuālo pakalpojumu sniedzēji

FAKTS:

HIV infekcija var skart ikvienu seksuāli aktīvu cilvēku neatkarīgi no vecuma, sociālā statusa, finansiālā un izglītības līmeņa

MĪTS:

Ar HIV var inficēties sociālu kontaktu laikā vai no dzīvnieku kodumiem

FAKTS:

Inficēties ar HIV var TIKAI no inficētas personas bioloģiskajiem šķidrumiem (asinis, izdalījumi no dzimumorgāniem, mātes piens)

MĪTS:

HIV simptomi ir viegli atpazīstami, tāpēc ātri var saprast, ka cilvēks ir inficējies ar HIV

FAKTS:

HIV organismā attīstās ļoti lēni. No inficēšanās līdz simptomu parādīšanās brīdim var paiet pat 10 gadi

MĪTS:

HIV ir tas pats, kas AIDS

FAKTS:

AIDS ir HIV beigu stadija, ja pacients nelieto medikamentus, ir pilnībā sagrauta imūnā sistēma

MĪTS:

HIV infekcija ir izārstējama

FAKTS:

HIV infekcija nav izārstējama, tomēr to ir iespējams kontrolēt, apzinīgi lietojot medikamentus

MĪTS:

Medikamenti jāsaņem lietot tad, kad būtiski pasliktinājusies pašsajūta

FAKTS:

Medikamenti jāuzsāk lietot uzreiz pēc diagnozes apstiprināšanas. Savlaicīgi uzsākot terapiju, pacients nevar izplatīt slimību tālāk

MĪTS:

HIV medikamenti izraisa smagas, nepārejošas blaknes

FAKTS:

Ārsti izvēlas medikamentu kombināciju individuāli, paredzot iespējamās blaknes un cenšoties tās maksimāli novērst

MĪTS:

HIV pozitīvi cilvēki nedrīkst radīt bērnus

FAKTS:

HIV pozitīva sieviete drīkst palikt stāvoklī un dzemdēt bērnus. Lai bērns piedzimtu vesels, jālieto antiretrovirālā terapija, to uzsākot, cik ātri vien iespējams